



Lista kontrolna przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Lenalidomide Glenmark

Poniższa lista kontrolna ma na celu ułatwienie udzielenia porady pacjentowi przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Lenalidomide Glenmark oraz zapewnienie, że jest on stosowany w sposób bezpieczny i prawidłowy.

Proszę wybrać odpowiednią kolumnę dla kategorii ryzyka pacjenta i potwierdzić przekazanie informacji.

Poinformowano pacjenta:	Mężczyzna	Kobieta, która nie może zajść w ciążę*	Kobieta, która może zajść w ciążę
O ryzyku teratogennego działania na płód?			
O konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji**przez okres co najmniej 4 tygodni przed rozpoczęciem leczenia, przez cały okres leczenia, w trakcie przerw w podawaniu leku, oraz przez co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia lub o konieczności całkowitego wstrzymania się od współżycia płciowego?	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
O konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji nawet jeśli pacjentka nie miesiącuje?	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Jakie są skuteczne metody antykoncepcji, które może stosować pacjentka lub partnerka pacjenta?		Nie dotyczy	
O możliwych konsekwencjach dla płodu oraz o konieczności pilnego skonsultowania się z lekarzem w razie podejrzenia ciąży?		Nie dotyczy	
O konieczności przerywania leczenia w razie podejrzenia ciąży?	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Jeśli partnerka pacjenta zajdzie w ciążę, gdy jest on leczony lenalidomidem lub krótko po zakończeniu stosowania lenalidomidu, należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego?		Nie dotyczy	Nie dotyczy
Jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży lub może zajść w ciążę i nie stosuje skutecznej metody antykoncepcji o konieczności stosowania prezerwatyw, nawet w przypadku mężczyzn po przebytym zabiegu wazektomii, ponieważ płyn nasienny może zawierać lenalidomid, nawet jeśli nie ma w nim plemników, w trakcie całego okresu trwania leczenia, podczas przerw w leczeniu oraz przez co najmniej 7 dni po zakończeniu leczenia?		Nie dotyczy	Nie dotyczy
Aby pacjent nie był dawcą nasienia podczas przyjmowania lenalidomidu a także podczas przerw w dawkowaniu, oraz przez co najmniej 7 dni po zakończeniu leczenia?		Nie dotyczy	Nie dotyczy
O ryzyku oraz niezbędnych wymaganiach związanych ze stosowaniem lenalidomidu?			



Poinformowano pacjenta:	Mężczyzna	Kobieta, która nie może zajść w ciążę*	Kobieta, która może zajść w ciążę
Aby pacjent nie udostępniał leku innym osobom?			
Aby pacjent zwrócił nieużyte kapsułki do apteki?			
Aby pacjent nie był dawcą krwi podczas przyjmowania lenalidomidu oraz przez co najmniej 7 dni po zakończeniu leczenia?			
Została skierowana na konsultację w celu uzyskania porady dotyczącej antykoncepcji (jeśli było to konieczne).	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Jest zdolny/a do przestrzegania zasad programu zapobiegania ciąży		Nie dotyczy	
Wyraziła zgodę na wykonywanie testów ciążowych, chyba że potwierdzono u pacjentki wykonanie sterylizacji jajowodowej.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
U pacjentki wynik testu ciążowego przed rozpoczęciem leczenia był ujemny (nawet jeśli pacjentka potwierdza całkowitą abstynencję seksualną).	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

NIE MOŻNA ROZPOCZĄĆ LECZENIA PACJENTKI, KTÓRA MOŻE ZAJŚĆ W CIĄŻĘ WCZEŚNIEJ NIŻ PO CO NAJMNIEJ 4 TYGODNIACH OD ROZPOCZĘCIA STOSOWANIA SKUTECZNEJ METODY ANTYKONCEPCJI LUB POTWIERDZENIU CAŁKOWITEJ I CIĄGŁEJ ABSTYNENCJI SEKSUALNEJ TRWAJĄCEJ CO NAJMNIEJ OD 4 TYGODNI, ORAZ PO UZYSKANIU UJEMNEGO WYNIKU TESTU CIĄŻOWEGO!